Le micosi dell'alveare

Emanuele Carpana

CRA-API Unità di ricerca di apicoltura e bachicoltura

Ciclo ontogenetico ape operaia

1		U O V O
2		
3	schiusa	
4	1 ^a muta	L A R V A
5	2 ^a muta	
6	3 ^a muta	
7	4 ^a muta	
8		
9	Opercolatura Filatura bozzolo	
10		P R O P U P A
11		
12	5 ^a muta	
13		P U P A
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21	Sfarfallamento

Miceti di interesse patologico per le api

Specie	Ospite	Comportamento
Ascosphaerales		
<i>Ascosphaera apis</i>	<i>Apis mellifera</i> (covata)	parassita (covata calcificata)
	<i>Megachile</i> sp (Fam. Apidae)	parassita facoltativo
<i>Ascosphaera major</i>	<i>Apis mellifera</i> , <i>Megachile</i> sp	parassita facoltativo
<i>Ascosphaera</i> spp	<i>Api selvatiche</i> (Fam. Apidae)	saprofita / parassita
<i>Bettsia alvei</i>	alveare	saprofita: "muffa del polline"
Aspergillus		
<i>Aspergillus flavus</i> <i>Aspegillus fumigatus</i>	<i>Apis mellifera</i> (adulti e covata)	saprofita / parassita (covata pietrificata)
Lieviti		
<i>Torulopsis</i> spp	<i>Apis mellifera</i> (intestino api)	patogeni occasionali
Altri		
Fungo non identificato	<i>Apis mellifera</i> (organi riproduttori ape regina)	patogeni occasionali (melanosi api regine)
Miceti vari	Alveare	saprofiti, patogeni occasionali

Covata calcificata o ascosferosi

- E' la più comune delle micosi di *Apis mellifera*.
- Provoca la morte delle larve dopo l'opercolatura causandone la mummificazione
- Agente eziologico:

Ascospaera apis

(Olive e Spiltor, 1955)

ex *Pericystis apis*,

(Maassen, 1913)

Fusione micelio + e micelio -

Corpi fruttiferi (sporocisti)

Spore in aggregati sferici

Spore libere

Fungo eterotallico
produttore di ascospore

Temperatura ottimale per
crescita vegetativa e
formazione delle spore:
30 °C

Distribuzione

Sviluppo dell'infezione

Infezione trasmessa
mediante le spore

- per via alimentare
- per via epidermica?

Germinazione spore
nell'intestino

Massima suscettibilità infezione:

- Infezione larve 3-4 giorni di età
- Raffreddamento 5-6 gg di età

La morte avviene generalmente entro 2 gg dopo l'opercolatura o al massimo in stadio di propupa.

% larve infette dopo
raffreddamento a 25 °C
effettuato a 5 gg di età

Effetto dell'età della larva e
della temperatura
Prove inoculo sperimentale
(Bailey, 1967)

% larve infette dopo
inoculo a 3-4 giorni di età

Sintomi

Mummificazione / calcificazione

Sintomi

Malattia inosservata se infezione < 12%.

Difese naturali

- Comportamento igienico
- Innalzamento della temperatura
- Microflora intestinale simbiotica

Propagazione

10^8 - 10^9 spore per larva mummificata

Le spore possono rimanere infettive per diversi anni

- ✓ in generale almeno 15 anni
- ✓ nel polline almeno 1 anno
- ✓ nel miele almeno 2 anni

Fattori predisponenti

Patologia da stress

Entro certi limiti è possibile la guarigione spontanea a seguito dell'asportazione delle larve calcificate da parte delle api operaie

- Shock termico (raffreddamento o eccessivo riscaldamento covata)
- Umidità
- Basso rapporto api adulte/larve
- Bassa consistenza numerica famiglie
- Eccessive manipolazioni delle famiglie
- Carenze nutrizionali
- Presenza di altre patologie
- Effetti collaterali acaricidi
- Predisposizione genetica: comportamento igienico

Profilassi igienica

- Localizzazione apiario
- Ventilazione
- Regine giovani di ceppi non suscettibili all'infezione
- Colonie forti ed equilibrate
- Spazio camera nido adeguato alla dimensione del glomere invernale
- Decontaminazione e ricambio materiale
- Nutrizioni adeguate
- Controllo altre patologie

Prevenire le situazioni di stress

Trattamento chimico

- Non sono disponibili farmaci registrati
- Le numerose prove finora effettuate con numerose sostanze diverse per natura chimica, principio di azione e modalità di somministrazione, hanno evidenziato limiti relativi a:

- ✓ applicabilità
- ✓ tossicità,
- ✓ accettabilità
- ✓ instabilità
- ✓ contaminazione prodotti
- ✓ ripetibilità risultati
- ✓ Influenza fattori ambientali
- ✓ Non corrispondenza risultati in vitro e in campo

Alcuni esempi di trattamento con sostanze di origine naturale

Olio essenziale di santoreggia

- 1 ml / kg candito (Francia)
- 0,1 % in sciroppo zuccherino (Spagna)
- Micostop (Chemicals Life): al 5% di olio essenziale; diluire 1:10 e somministrare per spray 3,5 ml per facciata di favo.

Timolo

0,7-0,8% spray (USA)

Muffa del polline

Bettsia alvei:

- fungo saprofita che attacca le riserve di polline immagazzinate nei favi, in inverno e inizio primavera, soprattutto in alveari deboli
- simile a *A. apis*, ma ha corpi fruttiferi più piccoli e spore non aggregate
- temperatura ottimale per la crescita = 18 °C

Covata pietrificata (aspergillosi)

Funghi del genere *Aspergillus*, di solito *A. flavus* e occasionalmente *A. fumigatus*, possono attaccare sia la covata (larve e pupe) che le api adulte

Patologia non frequente, interessa soprattutto l'Europa e il Nord America

Patogenesi e sintomi

Le spore germinano nell'intestino o meno frequentemente sulla cuticola delle larve.

Il micelio invade i tessuti, fuoriesce e in 2-3 giorni riveste la larva come una seconda pelle.

Dove il micelio è esposto all'aria, si formano i conidiofori.

Similmente il fungo si sviluppa nelle api adulte.

Azioni fisica e chimica: penetrazione micelio, enzimi e tossine.

Patologia di solito non grave: in una colonia solo una piccola parte di individui viene colpita.

Pertanto, conseguenze serie si possono registrare solo nelle colonie già indebolite o sottoposte a fattori stressanti.

Sintomi

Api adulte:

- ❑ agitazione, debolezza, paralisi, addome dilatato;
- ❑ mummificazione addome.

Covata:

- ❑ mortalità di solito dopo l'opercolatura, prima della trasformazione della larva in pupa;
- ❑ mummificazione di larve o pupe: trasformazione in una massa indurita ricoperta di micelio che dopo la sporificazione assume una colorazione verde-giallo (*A. flavus*) o verde-grigio (*A. fumigatus*)
- ❑ a volte le spore sono prodotte in quantità tale da riempire le celle contenenti le larve mummificate.
- ❑ Le api riescono solo parzialmente a rimuovere i resti della covata colpita

Fattori predisponenti

- Eccesso di umidità
- Fattori genetici
- Antibiotici
- Stress in genere

Profilassi

- Nessun trattamento specifico
- Livello di infezione elevato: distruzione del materiale, disinfezione
- Livello medio: messa a sciame
- *A. flavus* e rischio infezioni per l'uomo