A close-up photograph of a honeycomb with many bees working on it. The bees are clustered around the hexagonal cells of the comb, some appearing to be tending to the cells. The lighting is bright, highlighting the intricate details of the bees and the structure of the honeycomb.

Pratiche per il miglioramento genetico del patrimonio apistico locale

Luca Poggetti

Premesse

- Perché fare miglioramento genetico?

Premesse

- “Naturale” non è quasi mai sinonimo di produttivo
- In agricoltura non esiste niente di naturale (si può solo cercare un giusto compromesso tra produzione e adattamento)

Premesse

- Gli apicoltori modificano con le loro scelte il patrimonio genetico delle api che allevano (spesso nel modo sbagliato ...)
- Le scelte vanno indirizzate nella direzione giusta per
 - produrre
 - mantenere la biodiversità

Per esempio: è consigliabile allevare o no regine da celle di sciamatura?

Cosa sta succedendo

Due fenomeni paralleli

- ibridazione di massa
- Recupero e salvaguardia degli ecotipi locali

Regina Buckfast

Regina *A.m. mellifera*

Cos'è già successo

- Europa
Una volta
(Ruttner)

A.m. mellifera

A.m. carnica

A.m. ligustica

Cos'è già successo

- **Europa ora :**

- Apis mellifera mellifera* quasi estinta (*Verein der Züchter der Dunklen Biene in Österreich/ www.arche-austria.at*)

- Grande espansione di *A.m.carnica* e Buckfast

- Purezza di *A.m.ligustica* nel suo centro di origine molto a rischio (*Mussi-Lodesani*)

Cos'è già successo

- **Nel mondo**
 - *A. m. ligustica* conservata forse con un buon grado di purezza (Australia, N.Z., U.S.A., Cile)
 - Buckfast molto diffusa
 - *A. m. carnica* meno

Utilizzo di altre sottospecie in purezza o come “miglioratrici” (*A.m.caucasica*, Primorskj)

Massiccia presenza di ibridi più o meno “studiati” (api africanizzate del Sud America)

Api “africanizzate”

Apis m. caucasica

Gli ibridi

- Pratica diffusa da migliaia di anni (si cerca di sostituire, senza riuscirci, la sottospecie autoctona con una ritenuta “migliore”) (*Mussi*)
- *A.m. carnica* esportata nell’800 e anni 20 e 30 in buona parte dell’europa centrale a spese di *A.m. mellifera* (www.nordordbiene.de)
- *A.m.cypria* importata in Emilia (prima metà ‘900- *Mussi*)
- *A.m. lamarkii* importata in prov. TS (anni ‘30-Zandigiacomo)
- *A.m. ligustica* diffusa durante tutto il ‘900 nell’intera Europa a spese di *mellifera e sicula*
- *A.m. sicula* esportata in Germania (anni 2000)
- Padre Adam e l’ape Buckfast

Gli ibridi

- Negli U.S.A.: Buckfast e ibridi a più vie tra varie sottospecie (*(carnica x ligustica) x caucasica*)
- In Europa: Buckfast in Lussemburgo e Danimarca, ma anche in Belgio, Olanda, Francia, Germania, Austria. In Italia-prov. BZ e Piemonte (www.buckfast.dk)
- Quasi ovunque sono presenti popolazioni più o meno ibridate

Gli ibridi in Italia

A.m. mellifera

A.m. carnica

A.m. ligustica

A.m. sicula

- Da sempre naturalmente presenti nelle zone di confine

Gli ibridi in Italia

Buckfast

- Oggi

Ibridi
(*Giacomelli et al.*)

?????

E adesso?

Qualcuno torna indietro:

- In Svizzera (K.Glarus) e in Austria (Tirolo, Salisburghese) → recupero e **salvaguardia di *mellifera*** (presidio slow-food/melata di abete)
- ***mellifera* in purezza** su isole della Bretagna, Finlandia e Danimarca
- In Austria (Rosental-Jauntal) programmi di **salvaguardia dell'ecotipo di *A.m.carnica* locale** (*Carnica Karawanken*)
- In Italia (Sicilia) programmi di salvaguardia e **reintroduzione di *sicula***
- In molti paesi (Austria -Carinzia e Stiria-, Slovenia e Ungheria) → **leggi che tutelano l'ape locale**

In ogni caso...

- Sia chi si dedica all'allevamento dell'ape Bukfast sia chi "combatte" per il mantenimento in purezza degli ecotipi locali **pratica** una più o meno spinta **azione selettiva**
- *carnica* e *ligustica* sono ampiamente utilizzate nel mondo, ma nessuno può negare la validità della Buckfast

E da noi in Friuli?

- Storicamente → sovrapposizione degli areali di confine tra *carnica* e *ligustica* = popolazione ibrida locale

A.m. ligustica

A.m. carnica

E da noi in Friuli?

- Ora è presente una popolazione ibrida derivata da una mescolanza di razze, ibridi, ecotipi locali iniziata con l'arrivo della varroa (ogni stagione arrivano in Friuli nuove regine → da dove?)
- Queste due popolazioni ibride non sono la stessa cosa
 - spesso problemi di adattamento
 - famiglie molto popolose e con covata in inverno, niente scorte a fine estate ecc...

E da noi in Friuli?

- Non si fa (o si fa poca) selezione
- Siamo nelle condizioni di poterla fare?

OK

????????

Cosa ci serve?

- Per fare selezione è necessario controllare l'accoppiamento
 - stazioni di fecondazione
 - inseminazione strumentale

Foto Zuchtgruppe Nigra AiG. Stazione di fecondazione di Schneeberg in St. Veit in Pongau (1964)

Implicano

- capacità di allevamento delle regine
- pazienza e collaborazione

Foto Kleine Zeitung. Valentalalm 2009

Selezione all'estero

Nei paesi centroeuropei,
est Europa e prov. BZ

- Si riproducono per
inseminazione
artificiale le linee
migliori
- Si riproducono in
stazione di
fecondazione i loro
discendenti (allargare
la base genetica)
- Le regine fecondate in
stazione serviranno
come madri delle
regine utilizzate in
azienda

Prospettive

- Scegliere i tipi più adatti alle diverse zone

Prospettive

- Decidere quali sono i caratteri oggetto di selezione e redigere un piano selettivo

Compattezza della covata

Resistenza alle malattie della covata

Docilità

Prospettive

- Acquistare i riproduttori (preferibilmente in forma associata) → prezzi elevati:
 - regina inseminata artificialmente 300/400 €
 - regina da stazione di fecondazione 30/150 €
- individuare i più interessanti dal patrimonio preesistente → costoso in termini di tempo e capacità

Prospettive

- Testare i riproduttori (controllare il comportamento di più figlie possibile in apiari diversi)

Prospettive

- Avvalersi di stazioni di fecondazione per ogni tipo o razza allevata (in prov. BZ → 2 stazioni per Buckfast e 4 per *A.m.carnica*)

Prospettive

- Requisiti della stazione di fecondazione
 - isolamento riproduttivo (difficile ma il nostro territorio ci aiuta) → 8/10km da altri apiari o in montagna o in zone apisticamente “disabitate” (povertà nettarifera)

Prospettive

- Requisiti della stazione di fecondazione
 - presenza di almeno 10 famiglie allevatrici di fuchi ben popolate (se di più meglio)
 - 25mila fuchi per fecondare 100 regine (ma solo 3mila per alveare)

Condizioni per la riuscita

- La stazione di fecondazione deve essere un servizio per gli apicoltori
- Le regine presenti nella stazione di fecondazione devono essere state sottoposte al test della progenie (devono essere “sicure miglioratrici”)
- Ogni apicoltore deve selezionare nel proprio apiario le regine migliori che forniranno le figlie da portare a fecondare nella stazione

Grazie per

l'attenzione